

Поліомієліт повертається в Україну.

Що потрібно знати батькам?

Грізні епідемії поліомієліту виникали у першій половині XX століття у різних країнах світу, які уражали десятки тисяч людей. При цьому близько 10% хворих вмирало і близько 40% залишались інвалідами.

Упровадження поліомієлітної вакцини дало змогу в країнах Європи практично ліквідувати цю інфекцію, в тому числі в Україні.

В зв'язку з відмовою батьків від щеплень, у 2021 році в нашій країні зареєстровано спалах поліомієліту, серед не щеплених дітей.

Що необхідно знати про поліомієліт.

Поліомієліт – гостре інфекційне вірусне захворювання людини, характеризується ураженням головного і спинного мозку з розвитком атрофічних паралічів та парезів кінцівок і тулуба.

Збудник поліомієліту – вірус, який зберігається до 2 - 3 місяців у воді, на предметах навколишнього середовища (іграшках, посуді, білизні та інших предметах). Кип'ятіння знешкоджує вірус. Він швидко гине під дією дезінфікуючих розчинів, антисептиків, ультрафіолетового і сонячного опромінювання.

Основним **джерелом** збудника інфекції є інфіковані люди (хворі чи вірусоносії).

Механізм передачі. Для поліомієліту характерні два механізми передачі:

- I. У перші дні захворювання реалізується крапельний механізм передачі.
- II. Основне значення в поширенні інфекції має фекально-оральний механізм передачі. Тривале виділення збудника з фекаліями, його стійкість в навколишньому середовищі сприяють реалізації цього шляху передачі. Забруднені вірусами об'єкти (вода, харчові продукти, руки, посуд, іграшки, предмети побуту, тощо) можуть стати чинниками передачі збудника.

Клініка. Хвороба починається проявами загальноінфекційних симптомів: головний біль, лихоманка, кашель, нежить, відмічається біль в животі, дисфункція кишечника. У запущених випадках розвивається паралітична форма поліомієліту з паралічами та парезами кінцівок. Захворювання на поліомієліт є однією із важливих причин інвалідності у дітей.

Специфічне лікування відсутнє.

Профілактика поліомієліту. Хворих на поліомієліт терміново госпіталізують до інфекційного стаціонару. В осередках захворювання проводять заключну дезінфекцію.

Профілактичні щеплення проти поліомієліту мають головне значення в комплексі заходів по профілактиці цієї інфекції. Створення імунного прошарку 95% і більше, вакцинованого населення, забезпечить профілактику виникнення випадків поліомієліту.

Щеплення єдиний захід, який дозволяє надійно захистити дитину від захворювання на поліомієліт. Треба пам'ятати, що тільки своєчасне проведення щеплень може ефективно запобігти хворобі.

**Броварська районна філія
ДУ «Київський обласний центр контролю профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України»**